alditys vliegeralys prijswinnaar



Een biologische beschrijving van De Aldi Vlieger (Ned.)
Alditys Vliegeralys (A.D.) is een jonge telg binnen de vliegeralys familie en wordt sinds enkele jaren waargenomen op het vaste land van NW Europa. In 1999 was slechts de A.V. Deltamus waar te nemen, dit jaar waren ook de A.V. Monolijnus en A.V. Matrassus. De, we mogen rustig zeggen enorme, groei is toe te wijzen aan het juiste milieu voor A.V: volop interesse van homo erectus in de Vliegeralys familie en de lage prijs.
De A.V. familie is in verschillende kleurstellingen waar te nemen, ook combinaties van felle kleuren komen volop voor. Over het algemeen is A.V. niet groter dan 80 cm en wordt gevlogen met behulp van één of twee lijnen. De symbiose is zeer herkenbaar: A.V. wordt altijd samen waargenomen met homo erectus. Homo erectus is herkenbaar aan zijn/haar karakteristieke houding: de armen grijpen zich vast aan A.V. en staan onder de zo bekende hoek van 45 graden wijd uitgespreid aan homo erectus en bewegen zich continue van voren naar achteren en weer terug. Het vlieggedrag van A.V. is herkenbaar aan één of meerdere liggende achten waarna A.V. zich met volle snelheid in de aarde boort. Klaarblijkelijk ondervindt A.V. hier geen hinder van. Ook produceert A.V. een zeer herkenbaar geluid, afhankelijk van de vliegsnelheid (toonhoogte) wordt dit gekenmerkt als een brrrrrrrrrrrrmmmmmm, brrrrrrrrrrrrmmmmmm, plof.

A.V. is dit jaar voor het eerst grootschalig waargenomen op het strand van Scheveningen, op 6 en 7 juni. De zwerm streek neer temidden van Vliegeralys Giganticus en Vliegeralys Nauticus. De verwachting was dat de zwerm twee weken later neer zou strijken op het Deens eiland Fano. Wat V. Giganticus en V. Nauticus niet gelukt was, lukte hier wel, enkele duizenden telgen uit andere Vliegeralis families wisten A.V. op afstand te houden.

Aangenomen werd dat A.V. een éénjarige soort was, dit jaar zijn echter specimen waargenomen van voorgaande jaren waaruit biologen opmaken dat de familie zich snel aanpast aan zijn leefomgeving. Gevreesd wordt dan ook dat A.V. mogelijk zal gaan woekeren en de balans in de Vliegeralys familie zal verstoren. A.V. wordt slechts gedurende 6 tot 8 weken in de zomermaanden waargenomen, de rest van het jaar houdt A.V. winterslaap. Deze periode van 6 tot 8 weken is A.V. waar te nemen op stranden en weilanden, hoofdzakelijk in de buurt van campings en andere vakantie plaatsen en is niet schuw. Regelmatig wordt A.V. waargenomen op drukke stranden. Het vlieggedrag heeft eenzelfde uitwerking als dat van Vespula Vulgaris (gewone wesp), een